

Herpesul genital este o infecție cu transmitere sexuală (ITS) cauzată de virusul herpes simplex tip 2 (HSV-2). Virusul herpes simplex tip 1 (HSV-1) - care afectează de obicei buzele și zonele din apropiere - poate afecta uneori zona genitală și anogenitală.

HERPES GENITAL



01 TRANSMITEREA

Poate fi contagiat atunci când mențineți relații fără prezervativ prin sexul anal, vaginal sau oral sau prin contact genital strâns cu o persoană infectată. Deasemenea poate fi transmis și prin leziunile de mucoase ale pielii sau prin secreții în care virusul este prezent, chiar dacă nu există leziuni.

Odată ce apare infecția cu HSV, aceasta rămâne în organism pentru totdeauna și nu este eliminată. Fiind o infecție care nu se vindecă, persoanele infectate tind să aibă focare periodice.

Femeile însărcinate pot răspândi boala copilului său. Dacă herpesul genital este dobândit în timpul sarcinii, se recomandă să primiți un tratament adecvat pentru a reduce riscul de transmitere.



02 SIMPTOME

Peste 50% dintre persoanele cu herpes genital nu au simptome sau dacă le prezintă acestea sunt foarte ușoare. Când apar simptome este posibil ca infecția să fi avut loc cu mult timp înainte, săptămâni, luni sau chiar ani înainte. Cel mai caracteristic semn al infecției este apariția veziculelor dureroase la punctul infecției (vulva sau vagina, penis, anus, rect sau foarte rar în gură). Senzațiile de furnicături și mâncărimea sau durerea leziunilor sunt, de asemenea, simptome caracteristice. Veziculele ajung să se descompună, eliberând lichidul și se pot vindeca formând cruste sau produc leziuni ulcerative dureroase care durează săptămâni până la vindecare. Frecvent, după vindecarea leziunilor, simptomele reapar. Această situație se numește focar.



03 DIAGNOSTICUL

Uneori, poate fi diagnosticat prin observarea caracteristicilor leziunilor. De obicei, probele sunt prelevate din vezicule sau ulcere pentru testarea lor în laborator.



04 TRATAMENTUL

Herpesul genital nu poate fi vindecat, dar unele antivirale previn sau reduc durata focarelor și reduc șansele de transmitere a virusului.



05 PREVENIREA

Utilizarea prezervativului scade riscul de transmitere a infecției, dar nu o elimină complet, deoarece zonele infectate pot fi în afara zonei protejate de prezervativ. Se recomandă evitarea relațiilor sexuale până la sfârșitul tratamentului și dispariția simptomelor.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BENEFICIO SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CALIDAD E INNOVACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

FOR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASSANES



¿TIENES DUDAS SOBRE EL TEMA? PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org