

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС



Генитальный герпес – инфекция, передаваемая половым путем (ИППП), возбудителем которой является вирус простого герпеса 2 (ВПГ-2). Вирус простого герпеса 1 (ВПГ-1), обычно поражающий губы и соседние ткани, в некоторых случаях также может проявиться в области гениталий и заднего прохода.



01 ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

Герпесом можно заразиться при близком генитальном контакте или во время секса без презерватива с инфицированным человеком, будь то анальный, оральный или вагинальный секс. Также герпес передается через поражения кожи и слизистых, либо через биологические жидкости, в которых присутствует вирус, даже если видимые поражения отсутствуют.

После попадания в организм ВПГ остается там навсегда. Так как вирус не лечится, больные со временем привыкают к периодическим обострениям.

Беременная женщина передает болезнь ребенку. При заражении генитальным герпесом во время беременности рекомендуется пройти соответствующее лечение, чтобы снизить риск заражения младенца.



02 СИМПТОМЫ

У более 50% заразившихся генитальный герпес протекает бессимптомно, либо симптомы очень слабо выражены. Когда симптомы начинают проявляться, возможно, что инфицирование произошло уже давно, несколько недель, месяцев и даже лет назад. Наиболее характерное проявление заболевания – появление болезненных пузырьков в месте инфицирования (вульва, влагалище, пенис, задний проход, прямая кишка и очень редко во рту). Также часто встречаются ощущения покалывания или болезненности в месте появления пузырьков. Со временем они лопаются с выделением жидкости, а после могут заживать и покрываться корочкой или превращаться в болезненные язвочки, заживающие неделями. Часто после вылечивания повреждений симптомы возвращаются вновь; такой рецидив называется приступом.



03 ДИАГНОЗ

Часто диагноз можно поставить на основании природы повреждений. В большинстве случаев делают соскобы пузырьков или язв, которые затем отправляются в лабораторию.




04 ЛЕЧЕНИЕ

Генитальный герпес неизлечим, однако некоторые противовирусные препараты предотвращают приступы или сокращают их длительность, а также минимизируют вероятность передачи вируса другим людям.



05 ПРОФИЛАКТИКА

Использование презерватива сокращает риск заражения при вагинальном, анальном и оральном сексе. При совместном пользовании секс-игрушками важно надевать новый презерватив с каждым партнером и каждой секс-практикой. Рекомендуется воздержаться от половой жизни до окончания лечения или исчезновения симптомов.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



FOR SOLIDARIEDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia



ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org