

¿Dónde puedes encontrarnos?

Estamos aquí para apoyarte en todo lo relacionado con el VIH, tu bienestar y tu calidad de vida.

No dudes en contactarnos si necesitas ayuda o información. **¡Estamos para ti!**


Atención con cita previa:

C. Gandía, 1 (local 9ª Coworking Freeland)
Estaciones de metro más cercanas:
Pacífico (L1 y L6) Y Puente de Vallecas (L1)

Contacto para información:
Tel. 683 28 03 12
e-mail: madrid@gtt-vih.org

Contacto para atención jurídica:
Tel. 659 11 02 07

Síguenos en nuestras redes sociales:

 @gTtVIH
@infodrogasvih

 gtt.vih
 gtt_vih

 grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO
ANIVERSARIO 25
www.gtt-vih.org

Proyecto financiado por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid

04 Sífilis

CASTELLANO



 grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

Sífilis

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria

¿Cómo se transmite?

- **Durante las relaciones sexuales sin preservativo**, a través del sexo anal, vaginal u oral.
- La bacteria que causa la enfermedad **puede pasar de madre a hijo durante el embarazo o el parto**

¿Qué síntomas tiene?

- **Dependiendo de la fase** en la que se encuentre la infección, pueden aparecer los siguientes síntomas:
 - **Úlceras**
 - **Erupción cutánea**
 - **Inflamación de ganglios**
- Muchos **años después** de tener la infección **pueden aparecer graves problemas neurológicos o cardíacos**

La sífilis puede no presentar síntomas, por lo que si mantienes relaciones sexuales sin preservativo es importante que te realices una prueba de detección.

¿Cómo se diagnostica?

A través de un análisis de sangre (o de una prueba rápida si no has tenido sífilis anteriormente).

¿Cómo se trata?

Se cura con un antibiótico, pero no genera protección para toda la vida, por lo que te puedes volver a infectar.

¿Cómo prevenirla?

Usar preservativos reduce el riesgo pero no elimina del todo. Se recomienda no mantener relaciones sexuales hasta completar el tratamiento y los síntomas desaparezcan.

Es importante que mires si en tu zona genital y en la de tus parejas sexuales se observa algún signo de una posible ITS. Si tienes alguna sospecha, consulta con tu médico.