

Reinfecția cu HIV

Se spune că o persoană cu HIV a avut o reinfecție atunci când dobândește a doua tulpină a virusului. Reinfecția poate apărea pe aceleași căi ca și infecția inițială (relații sexuale neprotejate, partajarea seringilor etc.) și riscurile și mijloacele de protecție împotriva acestora sunt aceleași (vedeți fișele de informare HIV: Transmiterea HIV și Prevenirea sexuală combinată).



Nu iau tratamentul HIV, cum mă poate afecta reinfecția?

Deși nu este cazul, reinfecțarea cu HIV poate avea anumite riscuri și complicații. De exemplu, a doua tulpină poate fi rezistentă la medicamente, ceea ce vă poate limita opțiunile viitoare de tratament antiretroviral. De asemenea, această a doua tulpină poate face ca infecția să progreseze mai repede și să vă afecteze sănătatea.

Menținerea relațiilor sexuale sigure vă va proteja împotriva unei posibile reinfecții. De asemenea, va preveni transmiterea infecției către partenerii dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă urmez un tratament antiretroviral?

Șansele de apariție a reinfecțării sunt diferite în funcție de faptul dacă persoana urmează sau nu, un tratament antiretroviral. Astfel, persoanele care iau tratament antiretroviral au un risc foarte scăzut de reinfecție cu HIV. Acest lucru se datorează faptului că terapia sa acționează ca profilaxie împotriva HIV și reduce drastic riscul de reinfecție.

La fel, dacă apare reinfecția, dar tulpina HIV nu are rezistență la tratamentul pe care îl luați, nu va avea probleme în a controla și noul virus și nu va avea un efect relevant asupra sănătății dumneavoastră.

Cu toate acestea, chiar dacă luați tratamentul corect, există totuși șansele (deși foarte mici) să obțineți o a doua tulpină care este rezistentă la tratamentul pe care îl luați. În acest caz, reinfecțarea va însemna că încărcătura virală va deveni din nou detectabilă și va fi necesar să schimbați tratamentul.


A ține în evidență:

Reinfecția cu HIV presupune dobândirea unei a doua tulpini de virus, care uneori poate avea consecințe asupra sănătății dumneavoastră.

În general riscul de reinfecție și consecințele sunt mai mici dacă luați tratament antiretroviral.

Tratamentul este o măsură bună pentru a vă proteja sănătatea dumeavoastră și a partenerilor dumneavoastră. În plus, ajută la minimizarea riscului de reinfecție.

Dacă reinfecția are loc cu o tulpină cu rezistență, aceasta vă va afecta opțiunile de tratament.



gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41

Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta ficha no pretende sustituir la recibida por el médico. Las decisiones referentes a la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios. La información médica puede quedar desactualizada con rapidez.

Si te surge alguna pregunta tras leer esta ficha, te aconsejamos hablar con tu médico o enfermera o llamar a gTt-VIH, al 93 458 26 41, para comprobar si existe alguna novedad relevante al respecto.

SUBVENCIONA



Generalitat de Catalunya

Salut/ Agència de Salut Pública de Catalunya



Diputació de Barcelona

Àrea d'Iguatant i Sostenibilitat Social



Ajuntament de Barcelona

COLABORA



eSPiC
Equip de salut pública i comunitària