

06 (الكلاميديا) داء المتدثرة

العربية

gt grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
الكيان المعلم أنه ذو منفعة عامة
منظمة غير حكومية للتنمية

أين يمكنك أن تجدنا؟

نحن هنا لدعمك في كل ما يتعلق بفيروس نقص
المناعة البشرية VIH ورفاهيتك ونوعية حياتك.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة
أو معلومات. **نحن هنا من أجلك!**

الاهتمام عن طريق التعيين:

شارع Gandía غانديا، موقع واحد A 9
(مساحة عمل مشتركة في فريلاندا) (coworking Freeland)
أقرب محطات المترو:
Pacífico (L1 y L6) y Puente de Vallecas (L1)

الاتصال للحصول على معلومات:


الهاتف: 683 28 03 12


البريد الإلكتروني: madrid@gtt-vih.org

الاتصال للحصول على المساعدة القانونية:

الهاتف: 659 11 02 07

تابعنا على شبكاتنا الاجتماعية:

gtt.vih 

gtt_vih 

@gTtVIH 

@infodrogasvih

Proyecto financiado
por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid



www.gtt-vih.org

gt grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
الكيان المعلم أنه ذو منفعة عامة
منظمة غير حكومية للتنمية

(الكلاميديا) داء المتدثرة

كيف يتم نقلها؟

ويمكن الحصول عليه عند ممارسة الجنس دون استخدام الواقي الذكري مع شخص مصاب عن طريق الجنس الشرجي أو المهبلي أو الفموي. يمكن للحامل أن تنقل المرض إلى طفلها.

ما هي الأعراض التي لديها؟

معظم الأشخاص المصابين بعدوى داء المتدثرة (الكلاميديا) ليس لديهم أعراض.

عندما تظهر، فإنها تحدث عادة بين 2 و 14 أيام بعد العلاقة الجنسية، ولكنها قد تظهر بعد 21 أيام.

← قد تشمل الأعراض ما يلي:

- ← الإحساس بالحرق عند التبول
- ← جفاف أو التهاب الحلق

← وفي حالة الأشخاص الذي لديهم الفرج، يضاف إلى ذلك ما يلي:

- ← التغيرات في الإفرازات المهبلية
- ← التغيرات في الدورة الشهرية أو الألم في البطن

← في الأشخاص الذين لديهم قضيب:

- ← إفراز في نهاية القضيب
- ← ألم في مجرى البول و/أو الخصيتين

← عندما تكون العدوى في المستقيم، غالبًا لا تظهر أي أعراض؛ ولكن إذا كانت

موجودة، فإنها يمكن أن تسبب الألم أو الإفرازات أو نزيف المستقيم.

داء المتدثرة (الكلاميديا) هي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (ITS) تسببها البكتيريا. إذا ترك دون علاج، فقد يسبب مشاكل صحية خطيرة.

كيف يتم تشخيصه؟

يمكن تشخيصه بعينات مأخوذة من البلعوم و/أو المستقيم. للكشف عن العدوى في مجرى البول أو الفرج، عادة ما يتم إجراء اختبار البول.



كيف يتم علاجها؟

يتم علاج العدوى بمضاد حيوي. لا يوفر هذا العلاج حماية مدى الحياة، لذا يمكنك الإصابة بالعدوى مرة أخرى.



كيف نمنعها؟

يقلل الواقي الذكري من خطر الإصابة في الجنس المهبلي أو الشرجي أو الفموي.



إذا كنت مصابًا بالعدوى، فمن المستحسن تجنب العلاقات الجنسية حتى ينتهي العلاج وتختفي الأعراض.

