

Où nous trouver ?

Nous sommes là pour vous soutenir dans tout ce qui concerne le VIH, votre bien-être et votre qualité de vie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou d'informations.

Nous sommes là pour vous !

Attention sur rendez-vous :

C/ Gandía 1, local 9A (coworking Freeland)
Stations de métro les plus proches :
Pacífico (L1 y L6) et Puente de Vallecas (L1)

Contact pour information :
Tél. (+34) 683 28 03 12
e-mail: madrid@gtt-vih.org

Contact pour l'assistance juridique :
Tél. (+34) 659 11 02 07
e-mail: legal@gtt-vih.org

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 @gTtVIH
@infodrogasvih

 [gtt.vih](https://www.facebook.com/gtt.vih)
 [gtt_vih](https://www.instagram.com/gtt_vih)

www.gtt-vih.org

gt grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

Proyecto financiado
por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid


SUBVENCIÓN 0,7% IRPF



**Comunidad
de Madrid**

06 Chlamydia

FRANÇAIS



gt grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

Chlamydia

Comment est-elle transmise ?

Elle peut être contractée **lors de rapports sexuels sans préservatif avec une personne infectée**, par voie anale, vaginale ou orale. Les femmes enceintes peuvent transmettre la maladie à leur bébé.

Quels sont les symptômes ?

La plupart des personnes atteintes d'une infection à chlamydia ne présentent aucun symptôme.

Lorsqu'ils apparaissent, ils se manifestent généralement entre 2 et 14 jours après le rapport sexuel, mais ils peuvent apparaître jusqu'à 21 jours plus tard.

→ Les symptômes peuvent comprendre :

- sensation de brûlure à la miction
- gorge sèche ou douloureuse

→ Dans le cas des **personnes ayant une vulve, en plus :**

- Modifications des sécrétions vaginales
- troubles des règles ou douleurs abdominales

→ Chez les **personnes ayant un pénis :**

- écoulement à l'extrémité du pénis
- douleurs dans l'urètre et/ou les testicules

→ Lorsque l'infection est localisée dans le rectum, elle ne produit souvent aucun symptôme ; mais si les symptômes sont présents, ils peuvent provoquer des douleurs rectales, des écoulements ou des saignements.

La chlamydia est une infection sexuellement transmissible (IST) causée par une bactérie. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner de graves problèmes de santé.



Comment la maladie est-elle diagnostiquée ?

Elle peut être diagnostiquée à partir d'échantillons prélevés dans le pharynx et/ou le rectum. Pour détecter une infection dans l'urètre ou la vulve, on procède généralement à une analyse d'urine.



Comment est-elle traitée ?

L'infection est soignée à l'aide d'un **antibiotique**. Ce traitement ne confère pas une protection à vie, de sorte que vous pouvez contracter à nouveau l'infection.



Comment la prévenir ?

Les préservatifs réduisent le risque d'infection lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux.



En caso de presentar la infección, se recomienda evitar las relaciones sexuales hasta que finalice el tratamiento y desaparezcan los síntomas.