

Où nous trouver ?

Nous sommes là pour vous soutenir dans tout ce qui concerne le VIH, votre bien-être et votre qualité de vie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou d'informations.

Nous sommes là pour vous !

Attention sur rendez-vous :

C/ Gandía 1, local 9A (coworking Freeland)
Stations de métro les plus proches :
Pacífico (L1 y L6) et Puente de Vallecas (L1)

Contact pour information :
Tél. (+34) 683 28 03 12
e-mail: madrid@gtt-vih.org

Contact pour l'assistance juridique :
Tél. (+34) 659 11 02 07
e-mail: legal@gtt-vih.org

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 @gTtVIH
@infodrogasvih

 [gtt.vih](https://www.facebook.com/gtt.vih)
 [gtt_vih](https://www.instagram.com/gtt_vih)

www.gtt-vih.org

gt grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO


Proyecto financiado
por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid

SUBVENCIONA 0,7% IRPF



09 Lymphogranulome vénérien (LGV)

FRANÇAIS



gt grupo de
trabajo sobre
tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

Lymphogranulome vénérien (LGV)

Comment est-elle transmise ?

Vous pouvez contracter le LGV si vous avez des rapports sexuels sans préservatif avec une personne qui l'a déjà, que ce soit par voie anale, vaginale ou, plus rarement, orale.

Quels sont les symptômes ?

- Parfois, elle ne présente aucun symptôme, mais lorsqu'elle en présente, les plus courants sont les suivants :
 - douleur à la défécation
 - sang dans les selles
 - inflammation des ganglions
 - constipation
- Une petite pustule peut se développer dans la zone rectale ou vulvaire, se transformer en ulcère et disparaître sans traitement.
- Il peut également y avoir des écoulements au niveau du rectum ou du pénis.
- Ces symptômes peuvent s'accompagner de mal-être général, de frissons, de fièvre et de douleurs musculaires.

Le lymphogranulome vénérien est une infection sexuellement transmissible (IST) causée par une bactérie.

Comment la maladie est-elle diagnostiquée ?



Un **prélèvement rectal, urétral, vaginal**, de **l'ulcère ou des ganglions** est nécessaire.

Il est important de se faire soigner le plus rapidement possible car, si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner de graves problèmes de santé à long terme.

Comment est-elle traitée ?



Le LGV se traite avec des antibiotiques.

Même si vous l'avez déjà eu par le passé et qu'il a été traité correctement, vous pouvez toujours le contracter à nouveau, car le traitement ne vous protège pas à l'avenir.



¿Cómo prevenir ?

Les préservatifs permettent de réduire le risque d'infection lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux.



Si l'on vous a diagnostiqué un lymphogranulome vénérien, il est préférable d'**éviter les rapports sexuels jusqu'à ce que votre traitement soit terminé et que vos symptômes disparaissent.**